

HPV疫苗保護力有多久

因目前追蹤受試者的時限最長為約14年，所以尚無法證實接種HPV疫苗後可維持多長的保護效期。最新資料顯示，「保蓓」疫苗(二價疫苗)保護力至少11年，「嘉喜」疫苗(四價疫苗)保護力至少14年，「嘉喜」疫苗(九價疫苗)保護力至少10年，但長期保護力仍須持續觀察方能確定。

誰需要打HPV疫苗

HPV疫苗對於性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效(但有性行為經驗者仍可接種)。HPV疫苗公費補助對象為我國國中二年級學生。

有意願接種HPV疫苗之非公費補助對象，需要自行洽詢醫療院所預約接種，接種前可至食品藥物管理署網站查詢疫苗仿單，並按照仿單建議之接種年齡、方式、期程接種HPV疫苗，保護自身健康。



接種疫苗注意事項

- 1 懷孕或準備懷孕者不宜接種。接種前如有以下情形者，應告知醫師並請醫師評估：本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。如果接種後發現已懷孕，無須驚慌，只要停止後續尚未接種的劑數即可。
- 2 接種HPV疫苗可能發生的常見不良反應為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多屬輕微至中等程度且為時短暫。
- 3 接種後應原地休息15分鐘，沒有任何不適症狀再離開，如果之後有任何不舒服的情形都請通知學校校護、醫療院所或衛生所等原接種單位，亦可撥打HPV疫苗服務專線0800-88-3513（寶貝，守護一生）。



HPV 疫苗



施打HPV疫苗

守護健康 保護自己



衛生福利部國民健康署

Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare.

經費由國民健康署運用菸品健康福利捐支應 (國產)

什麼是HPV

人類乳突病毒 (Human Papillomavirus, 簡稱HPV) 是一種DNA病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有兩百多型，分為低危險型與高危險型，是人類重要的傳染病之一。

什麼是HPV疫苗

持續感染高危險型人類乳突病毒(HPV)是子宮頸癌發生的主因，也是造成頭頸、外生殖器及肛門癌的原因之一，目前已研發出可預防人類乳突病毒感染的疫苗，因疫苗的涵蓋價數不同，理論上可以預防60-90%的HPV感染。我國食品藥物管理署已核准3種疫苗上市，分為保蓓Cervarix®、嘉喜(四價)Gardasil®、嘉喜(九價)Gardasil 9®，目前我國公費對象接種的是九價HPV疫苗。疫苗上市前經過嚴謹的安全性試驗評估，顯示HPV疫苗是安全且有效的。



HPV疫苗介紹

疫苗名稱	保蓓 Cervarix®		嘉喜 (四價) Gardasil®		嘉喜 (九價) Gardasil 9®	
適用對象	9-14 歲女性	15 歲以上女性	9-13 歲女性	14-45 歲女性 9-26 歲男性	9-14 歲男、女性	15-45 歲男、女性
接種劑數	2 劑	3 劑	2 劑	3 劑	2 劑	3 劑
第 1 劑	第 0 個月		第 0 個月		第 0 個月	
第 2 劑	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 1 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月
第 3 劑	X	第 1 劑後 6 個月	X	第 2 劑後 4 個月	X	第 2 劑後 4 個月
適應症 預防型別	HPV 第 16、18 型		HPV 第 6、11、 16、18 型		HPV 第 6、11、16、18、 31、33、45、52、58 型	

疫苗資訊均記載於仿單中，最新仿單資訊請查詢食品藥物管理署網站
<https://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx>

相關資訊請上國民健康署官網
<https://www.hpa.gov.tw>



如有發生不良事件，請撥打
免費服務專線0800-88-3513
或通報至食品藥物管理署不良反應
通報系統(<http://adr.fda.gov.tw>)
或藥物不良反應通報系統
02-23960100